

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百七十三

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣林大本

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十三 明

周王朱橚撰

積聚門

久積癥癖

附論

癥之為病雖有形證推之不動癖之為病僻在脇肋按
之水鳴此皆飲食留滯所致也不即治日漸增長盤結
牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身瘦腹
大名曰久積癥癖

方

五石烏頭丸 治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖
及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之
者

鐘乳鍊

硫黃

礬石

紫金英

一作紫石英

枳實

赤石脂

甘草

白朮

紫苑

防風

白薇

山茱萸

桔梗

天雄

皂莢

細辛

菰蓉

人參

附子

去皮 藜蘆一兩六銖

麥門冬

乾薑

吳茱

莢 蜀椒

桂心

各二兩半

烏頭

三兩厚朴

遠志

茯苓

苓

各一兩半 當歸

二兩棗膏

五兩乾地黄

一兩十株

右為末，鍊蜜和，搗五千杵，如梧子大，酒服九日，三稍

加之

夾食丸

一名丁香丸
出聖濟總錄

治癥癖食氣食勞五隔痰逆并

夾食血氣疼痛

乳香

別研如粉

木香

丁香

肉豆蔻

去殼

當歸

切焙

青橘

皮

去白

京三稜

炮剉各半兩

紫苑

去苗土

乾薑

炮剉

細附子

炮裂去
皮臍
巴豆
去皮心別研紙裏
水壓去油各一兩
紫甲
去裙襴用醋
煎慢火炙令

黃色
二兩
丹砂
一分
研如粉

右除乳香丹砂巴豆外搗羅為末然後乳香等三味
同研令勻都入臼中用蕎麥麴與藥末臨時以意看
多少如麴搗徐徐入新汲水搗候可丸即止丸如棗
豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五沸漉出於日
中曝乾每服五丸食後用茶酒溫水下要轉時只以
冷茶下熱茶投即行也

紫金丹

出聖濟總錄

治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積

冷胸腹氣刺痛

鐵滓

一斤淘淨控乾

硫黃

半斤水飛過

硃砂

二兩

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗慢火煎硫黃火上無焰即燂乾刮此二味入瓷合內固濟了用大火煨三度畢取合內藥再用水飛不用鐵滓控硫黃令乾入細瓷合內坐在平地別用火一秤煨至火盡取出入硃砂二兩同研令細再入合內

用火一斤就灰池中養三日放冷取二兩再入下項藥

硃砂

半兩

木香

末

丁香

末

膩粉

丹砂

研

肉豆蔻

去殼

末

乾漆

炒煙盡研

胡椒

末

阿魏

用醋化麝和作餅子燒熟為末各一錢

砒

霜

末一分半

右一十味研細再同硫黃研勻用酒醋鍾半煎五靈脂薄麪糊丸如梧桐子大每服從五丸漸加至二十丸以意加減服若取積滯癥癖及酒食積急氣冷氣

一切滯氣等疾更入後藥

巴豆仁

研一兩

大戟末

半兩

芫花末

半兩

草烏頭

一分

五靈

脂末

一兩

膩粉

二錢

硃砂

研半兩

右七味以米釀醋二升入銚子內熬成膏便與前藥末搗為丸如梧桐子大量虛實加減服送一丸加用醋湯或茶清下

礞石丸

出華陀中藏經方

治男子婦人遠年積氣消磨癥塊

取虛中積脇肋堅硬腹刺痛及治脾滯氣酒食所傷

飲食不化惡心嘔逆胸膈不快不思飲食胸腹脹滿
臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰瘰癧癥瘕
發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑
不調裏急後重及十隔氣虛中有積婦人血氣塊硬
悉主之

礞石

半兩青色者生用
搗羅為細末

硃砂

丁香

桂

去麋皮

乾薑

炮各二兩

木香

京三稜

煨剉

蓬莪朮

煨剉

羌活

醋浸一宿炒煎

檳

榔

煨剉為末

猪牙皂夾

去皮炙黑

肉豆蔻仁

各兩

青橘皮

湯浸去白

焙白豆蔻仁

墨

燒八分熟各半兩

巴豆

一兩半去皮心膜出油浸

胡

椒

一分大黃

一兩半半兩生用半兩煨熟半兩炒焦

粉霜

細研一分

右為末用醋三升飛礶砂於銀石器中文武火熬二十沸次入巴豆又熬五七沸次入礶石京三稜末又熬三五沸次取白麵二兩以無灰酒半升調入藥中又熬一兩沸次入大黃末又熬三兩沸次下諸藥末不住用柳木杖子攪勻候稠擣千杵丸如菴豆大每服三丸不問男女長幼心痛醋湯下左脇下疼煎薑

棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦人血癖血氣炒生薑醋湯下久患冷痢煎黃連湯下小兒常服冷水下有姓者不得服小兒以意減丸數

陳橘皮煎丸

出聖濟總錄

治久積冷氣攻心腹痛痠癖

嘔逆腹脹滿不思飲食肌膚瘦瘁腰膝倦痛下痢洩瀉瘡疾腸風并婦人血海久冷無子

陳橘皮

湯浸去白焙十五兩別搗為末

巴戟天

去心

石斛

去根

牛膝

酒浸

切草薺

各三兩

肉蓯蓉

酒浸切焙

鹿茸

去毛酒炙

杜仲

去麋皮炙剉

菟絲子

酒浸三日
別搗剉

附子

炮裂去
皮臍

陽起石

酒浸研
如粉厚

朴

去蘘皮生
薑汁炙

甘草

炙剉
一兩

吳茱萸

湯洗焙
乾炒

當歸

切乾
焙

薑

炮
京三稜
剉

右為末先以好酒五椀於銀石器內煎橘皮末令如

錫入藥攪勻再搗三五百杵稍乾更入酒少許和丸

如小菴豆大每服二十九至三十九空心溫酒下鹽

湯下亦得

治一切塊癖積氣血聚等一二十年疾

細墨

半兩燒

羌花

醋浸炒焦赤

青礞石

大戟子

乾漆

炒

五靈脂

荆三稜

蓬莪茂

蜜陀僧

陳皮

牡蠣

各半兩

巴豆

一兩去皮濕紙三兩重裹燒紙焦整大棗十四箇去核

白丁

香

硃砂

研黃蟲

去翅足

斑蝥

去翅頭各一分

右為細末酒醋煮糊為餅子每服十餅用煮麵湯送

下宜食前服

溫白丸

出鮑氏方

治心腹積聚久癥癖塊腹脹心下堅結

大如杯椀傍攻兩脇心痛積年食不消化等病並治

之

紫苑

淨洗二分

吳茱萸

二分淨擇鹽水洗過

菖蒲

一分去蘆米泔浸過一宿水洗

柴胡

二分去蘆頭水洗過

厚朴

去皮生自然汁浸炙香熟

桔梗

皂莢

去皮

尖茯苓

各二分

桂心

三分生用

乾薑

炮

黃連

各二分

蜀椒

三分

用紙襯於鉢內
出汗去根枝用巴豆

稍焦為度爛研巴豆以紙裹

壓出油如此三度換
新紙然後入衆藥

人參

各三分本方各二分

烏頭

十分炮裂後掘

地坑內之用蓋子蓋一饌間
却出烏頭去尖皮再切用

右搗篩以白蜜和更搗二千五百杵丸如梧子大有病

服一九至二九不知稍增至三九五九以知為度主
心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔吐
肢滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻脇徹
背連胸痛無常處繞臍攪痛狀如蟲咬又療十種水
病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積
年食不消化或婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝或痰
瘥連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或
半身不遂或疼痛或眉髮墮落又療七十二種風三

十六種遁尸症或癰疽或婦人五邪失心夢與鬼神
交通四肢沉重不能飲食昏昏默默口欲取死終日
憂愁心中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不調直
似懷孕連年累月羸瘦困敝遂至於死或歌或哭為
鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣之方驗
便合藥與婦人服之十日下出癥瘕蟲長二尺五寸
三十枚下膿二升黑血一升青黃汁五升所苦悉除
當日有子臣兄墮馬被傷腹內有積血天陰即發羸

瘦異常命在旦夕與藥服下如鷄肝黑血如手者二百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣之方驗敢不獻上忌生冷酥滑猪鷄魚犬牛馬麋肉五辛油麵豆糯米陳臭等物一方無肉桂用生薑湯下

木香丸

出聖濟總錄

治遠年癥塊積聚

木香

硃砂

研當歸

切炒各一兩

礞石

研三分

大黃

煨陳

麵

不神者炒麥蘖

炒墨研

白麴

各半兩

大戟

炒乾漆

炒煙出

敗

膩粉

各一分

巴豆仁

一錢一分不出油研

右為末以臘月雪水同搗三百杵丸如菰豆大每服一九空心用乾柿爛嚼裹藥隨所傷物煎湯下不得吐津

鱉甲丸 出聖濟總錄

治久積癥瘕

鱉甲

大者一枚淨洗去筋膜麪裹外面二三分厚上面用紙固濟泥一風爐子安鱉甲在上面

別入桃仁半斤去尖皮雙仁研以米醋四升無灰酒三斤硃砂三兩同攪拌旋入向鱉甲中煎為膏取出用合盛却將鱉青橘皮去白麥蘗炒沉香剉甲去紙泥炙令黃色

肉豆蔻

去殼各三兩

丁香

木香

檳榔

半生半熟

陳麴

炒

京三稜

煨剉

大黃

生剉厚朴去粗皮生薑拌炒令紫各二兩

柴胡

去苗半斤

桂

去粗皮二兩

右為末再研令勻用桃仁煎并熟蜜和丸如梧桐子

大空心米飲下二十丸

水銀丸

治久虛損癥癖

水銀

豉

研

礞石末

滴酒和勻瓷合內慢火逼乾各半兩

膩粉

京

三稜末

石三稜末

鷄爪三稜末

粉霜

白

丁香末

硃砂

研各三錢

肉豆蔻

去殼研

檳榔

各二枚為末

丹

砂三錢研

右合研勻細用棗肉和丸如棗豆大每服五丸溫水下又一方治丈夫病入懷香補骨脂各一分治婦人病入血竭沒藥各一分

三稜丸 治多年積氣癥癖

京三稜剉煨 鷄瓜三稜剉煨 陳橘皮 青橘皮各湯浸去白焙

巴豆去皮心膜出油 石三稜煨剉各五兩 檳榔十枚半生半熟剉 肉豆

菟十枚去殼醋浸二宿 丁香 益智出皮各一兩 木香二兩 硃砂一兩

半飛過

右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服三丸如當
心氣塊菜羹湯下左右氣塊木香湯下本臟氣塊懷
香子湯下

人參丸 治久癖塊聚心腹脹滿

人參 元參 沙參 丹參 防風 苦參 附

子

炮裂去皮
臍各一兩

巴豆

去皮心煮研
去油三十粒

蜀椒

去目并開口
炒出汗一分

乾

薑

炮半兩

蟻蟲

三枚
熬

葶藶

炮炒研
一合

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後米飲下一丸
未利再服一方用大黃四兩

蓬莪茂散 治久積癥癖氣不散脇下似覆杯多吐酸
水面目萎黃或腹中疼痛

蓬莪茂

一兩 鱉甲

二兩 鹽醋炙 今黃去裙襖

赤芍藥

半兩

肉桂

一兩 去皺

皮枳殼

一兩 麩炒

當歸

一兩 剉

乾薑

半兩

京三稜

一兩 泡剉

川大

黃

一兩 剉 碎微炒

木香

一兩 柴胡

一兩 半 去苗

檳榔

一兩

右件為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

三稜沒藥丸 治遠久沉積塊痰悶

京三稜

泡

廣茂

煨

檳榔

鯊甲

醋炙

石礬

燒赤

青皮

去油

乾漆

炒煙盡

雷丸

各半兩

丁皮

硃砂

沒藥

各二錢

右為細末醋糊為末如菰豆大每服五七丸白湯下
食前日進四服

丁香丸

治久積食癖心腹時發疼痛胸膈不快痰逆

惡心臟腑不調不思飲食或下痢膿血裏急後重散

惡氣逐滯結

丁香

木香

桂

去粗皮

阿魏

麝裏煨去麝研

麝香

研硫黃

研

水銀

二味於蓋內結成

硃砂

研

粉霜

胡粉

研明一分

巴豆

去皮心

右十一味搗羅三味為末與八味合研勻用安息香半兩酒化濾過入蜜少許重湯同熬和劑旋丸如梧桐子大每服三丸至五丸臨時煎生薑棗湯下更看虛實加減取下積聚惡物為効

三稜湯 治久積癥癖不散心下結成狀如伏梁

京三稜

炒

鱉甲

醋炙去
裙襴

大腹

剉炒各
一兩

桂

去粗
皮

白芍

藥

陳橘皮

去
焙

當歸

切
焙

枳殼

去瓤
炒

高良薑

各三
分

木香

訶梨勒

煨去核
半兩

右細剉每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服

鱉甲丸

治久癖結兩脇臍下堅如石按之痛劇食飲

不下

鱉甲

去裙襴
炙二兩

牛膝

酒浸
切焙

芳蔚

防葵

當歸

切
焙

乾薑

炮

桂

去粗皮

附子

炮裂

甘草

炙各一兩

大黃

剉一兩半

巴豆

一枚

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下三
丸加至五丸日一服以利為度一方用細辛四分粥
飲下

大黃丸 治久積癥癖堅牢羸瘦不能飲食宜服

川大黃

剉一兩

乾薑

炮一兩

川芒硝

一兩

桔梗

一兩

石膏

半兩

甜葶藶

一兩半

赤茯苓

半兩

附子

半兩

杏仁

半兩

川烏

湯浸

頭

半兩

川椒

半兩
去膜

右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如棗豆大每服不計時候溫酒下二十丸

蓬莪茂丸

治久積癥癖氣攻左脇如覆杯及婦人血

瘕

蓬莪茂

炒一兩

桂

去粗皮
三分

芍藥

檳榔

剉

枳殼

去瓢

當

歸

切焙

木香

昆布

洗去
鹹汁

沉香

剉

白芷

炒各
半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煨薑木

瓜湯下

木香丸

出聖濟總錄

治五毒五積五勞并一切氣疾癥癖

塊及遠年積

丁香兩附子

汔烏頭

皮去檳榔剉

芫花

醋炒

大戟炒甘

遂

炒紫苑

去苗各一分

硃砂

醋飛過焙乾研一兩

膩粉

研一分半

右一十味先將八味搗羅為細末入藥研和勻麪糊

丸如梧桐子大每服七丸至十丸醋湯下

消積丸

出聖濟總錄

治久積癥癖冷熱不調痰逆否悶心

腹刺痛喘滿膨脹泄利羸困不思飲食

代赭

煨醋三
七遍研

礞石

研各
一兩

白茯苓

去黑
皮

桂

去粗
皮

青橘

皮

湯洗

巴豆

去皮心
各半兩

京三稜

煨

棟實肉

各一
分

硃砂

研三
分

右為末拌勻酒煮麤糊和丸如梧桐子大每服二丸

木香湯下看虛實加減

桃仁散

出聖
惠方

治久積癥癖氣結不散面色萎黃羸瘦

食少宜服

桃仁

一兩湯浸去
皮尖雙仁

鱉甲

二兩半塗
醋炙令黃

京三稜

一兩
泡剉

當

歸三分

肉桂

一兩 去皮

枳實

一兩 麩炒

木香

半兩

檳榔

三分 川大

黃

三分 對

右件藥為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

麝香丸

出聖惠方

治久積癥癖氣不差或於脇肋作塊形

大如杯或如鷄子大透隱皮膚或時疼痛堅硬如石

宜服

麝香

一兩 細研

蓬莪茂

三兩

草薺

二兩 對

芫花

二兩 拌炒

醋

神麴

一兩 炒 鱉甲

二兩 塗 醋炙

大麥蘖

一兩 炒

乾漆

一兩 搗 碎炒

京三

稜 二兩 坐

右件藥為末入麝香研令勻用醋煮麪和丸如梧桐

子大每服食前溫酒下十丸

附子丸 治久積癥癖腹滿不能食

附子

一兩 泡

巴豆

三十 枚

麤蟲

五十 枚

川椒

一合 去目

乾薑

半兩

防葵

一兩 兩

甜葶藶

一合

川大黃

一兩 剉

右件為末研入巴豆令鍊蜜和搗三百杵丸如梧

桐子大每服食前下三丸

巴豆丸

出聖惠方

治久積癥癖及一切惡氣並服

巴豆

一兩去皮

硃砂

一兩飛研

京三稜

一兩剉

香墨

半兩

青橘皮

二兩湯浸

附子

一兩泡裂

乾漆

一兩

川大黃

一兩剉

右件藥京三稜乾漆為末入在巴豆醋內同熬及一半次入硃砂更熬令稠後下大黃青橘皮附子香墨等和搗三二百杵丸如菉豆大每服空心煎橘皮湯下三丸血癥塊即用當歸酒下一切惡物溫酒下

比金丸

出聖濟
總錄

治久積伏滯成塊婦人血癖血塊及

產後敗血不行兒枕刺痛小兒如癖常服利胸膈除

傷滯

沒藥

研一錢

五靈脂

研半兩

皂莢

去皮子末三錢

白丁香

雄者研

硃砂

研

乳香

各錢半

巴豆

一百粒
去皮心

右為細末用大棗十枚去核刮巴豆膏入在棗內線

纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合勻搗成泥

丸如棗豆大大人臟腑實者五丸虛者三丸小兒芥

子大一歲三丸五七歲以上七九十歲以上十九丸取
積用燒皂子膿煎湯放冷下利胸膈用棗二枚爛嚼
裹藥乾嚥不得嚼藥並臨卧服急患不拘時一方粥
飲下

硃砂丸

出王氏
博濟方

治久積癥癖塊心腹脹滿胸膈不利

痰實胃脹宣

硃砂

好者
二錢

狼毒

剉醋
炒乾

芫花

醋浸
一宿

乾漆

炒煙
出

鰾甲

炙
各

一雄黃

好者
一分

巴豆

三七
粒

右為末和勻煮麴糊丸如豌豆大每服三丸食後臨卧溫生薑湯下

京蓬煎丸

出聖生
拔萃方

治痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈症

悶通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿穀

京三稜

二兩酒浸
冬三日

枳殼

麴炒
去瓢

廣茂

二兩醋浸
冬二日

木香

末青皮

去油

茴香

微炒

檳榔

各一兩

右為細末水糊為丸豌豆大每服三十丸生薑湯下

加硃砂水銀治肉積 神麴麥蘖治酒積 水蛭

蜜虫治積血 木香檳榔治氣積 甘遂牽牛治水積
雄黃膩粉治涎積 礞石巴豆治食積要在臨時
通變也

療腹中癥癖兼虛熱者不用純冷專瀉藥宜羈縻攻之
方

鱉甲炙 龜甲炙 桑耳金色者 大黃 吳茱萸 防葵

各八分 附子泡四分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大酒服十九日再服漸

加一丸以微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四合以差為期馬齒菜即馬莧也忌猪肉冷水

京三稜丸

出聖惠方

治久積癥癖氣不差令人羸瘦不思

飲食

京三稜

二兩

川烏頭

一兩

礞砂

一兩

陳橘皮

二兩

乾薑

一兩

泡

雄雀糞

一兩
微炒

右件藥為末入硃砂研令勻以醋煮麴糊和丸如梧桐子大每於食前以酒下十丸

沉香三稜煎丸

出聖濟
總錄

治臟腑久積氣塊冷痞不思

飲食

沉香

人參

各一兩

青橘皮

湯浸去白
焙一兩半

京三稜

三兩
搗末

右以三味為入三稜礱砂煎內和丸成劑有餘煎更
於火上慢熬搗千百杵丸如桐子大每服三十丸食
前米飲下婦人醋湯下日再

三稜草煎方

出本
草

治癥癖又主鼓脹滿

右以京三稜切一石水五石去滓更煎三斗汁銅器

中重釜煎如稠糖出內蜜器中每服一匙用酒一盞服之日二每服常令酒氣相續

熨癰癖方

出聖惠方

吳茱萸

一升川烏頭三兩

右件藥搗碎用醋拌炒令熱分作二包更番熨之

治久積癰癖及元氣急痛方

出聖惠方

川烏頭

二兩泡川椒一兩去目

右件藥為末用鷄子白和丸如麻子大每服不計時

候溫酒下十九

治久積癥癖及心腹鼓脹並宜服此方

出聖惠方

右用烏牛尿五升於銀器中微火煎如稀飭每服空心以熱酒調下一匙頭服後當腹中鳴轉病出隔日更服

防葵丸

出聖濟總錄

治癥癖氣塊脇肋妨滿腹脹腹痛不

能飲食

防葵

劉坐碎

柴胡

去苗

赤茯苓

各三分

桂

去粗皮

木香

各半兩

鱉

甲去裙襪炙黃色檳榔剉各一兩半桔梗炒郁李仁湯浸大黃炒一

兩當歸切焙京三稜泡五味子各半兩

右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧

桐子大空腹溫酒下二十九一方有赤芍藥無赤茯

苓

驚甲丸出聖濟總錄

治癰瘕氣塊

驚甲去欄醋炙黃色木香烏頭泡裂去皮柴胡去苗各一兩半當歸

切京三稜泡剉桂去粗皮厚朴去粗皮陳橘皮各二兩甘草

炙檳榔劉各半兩 大黃劉碎炒 朴硝研如粉各三兩

右除朴硝搗羅為末同研令勻煉蜜和丸如梧桐子
大空心服用溫酒下十丸米飲下亦得

大戟丸出聖濟總錄

治癥癖化氣取食積及本臟氣水痰

蟲脹

大戟半兩 芫花醋炒一兩 巴豆一百粒去皮油 甘遂 乾薑炮 陳

橘皮去白焙 硃砂 姜黃 桂去粗皮各一分

右為末於銀器內炒令極熱勿令焦鍊蜜丸梧桐子

大常服生薑湯下一丸如取轉量臟腑虛實加減

檳榔湯

出聖濟總錄

治癥癖腹滿如鼓坐卧不安食即欲

吐氣悶喘急

檳榔

二兩

赤茯苓

去黑皮

芍藥

京三稜

陳橘皮

湯浸

各一兩半郁李仁

湯浸退皮一兩

食茱萸

三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空

心午後用

柴胡湯

出聖濟總錄

治癥癖氣腹痛脇肋脹滿不思飲食

柴胡

去苗

赤茯苓

去黑皮各三分

桔梗

炒

木通

炙

芍藥

鱉

甲

去裙襴炙黃色

郁李仁

湯浸各半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服

空腹午後用

五食丸

治虛積食氣壅脹水氣年深癥癖

大戟

刮去皮

甘遂

各半兩

猪牙皂莢

生去皮子一兩

胡椒

一分

花

半兩醋浸一宿炒乾

巴豆

半兩去皮

右為末合研勻水煮麪糊和丸如菉豆大每服五丸

用米麪菜肉豆煎湯放溫下量病人大小加至七丸
婦人有胎不可服

牛膝丸

出聖濟
總錄

治癥癖積聚

牛膝

酒浸

芍藥

桔梗

赤茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮

大

黃芩

剉炒

此胡

去苗

訶梨勒

各三兩

陳橘皮

去白

檳榔

剉

枳

殼

炒一兩

右末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心棗湯
下加至三十九丸通利為度

消癖丸

出危氏方

治彌年經吐汗下營衛虧損邪氣伏藏

脇間結為癥癖腹脇疼痛

芫花

炒硃砂各等分

右為末鍊蜜丸如小豆大每服十九丸濃煎棗湯下去

癖須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯

治癥癖

出本草

右用馬莧汁飲之小兒服尤良

金寶神丹

楊氏家藏方

治諸積癖塊血刺心腹下痢赤白

及婦人崩中痛下一切虛冷之疾尤治飲食過多臟腑滑泄久積久痢並皆治之

青礞石

半斤細羅過將
消石二兩細研

右件滴水圓如小鷄頭大候乾再入乾鍋內少火煨火紅收之每有虛冷病服一丸至二三丸空心溫水送下少食壓之久病泄痢加至五七圓或十九不妨烏金餅子治堅癥積塊狀如覆杯腹不下食及至婦人血氣刺痛

乾漆

一兩炒焙
出為末

沒藥

一分硃砂一錢

右為細末棗肉和圓如桐子大作餅子每服三餅子

男子鹽湯婦人醋湯食後服

治癰瘰血瘕破血

出本草

右用馬鞭草作煎如糖酒服

治風冷癰瘰

出本草

右用木天苓苗藤切以酒浸服或以釀服大効

治癰瘰病又治瘰癧氣

鱉甲 訶梨勒皮 乾薑

右各等分細末為丸空心下三十九日再服如專治
瘡癰氣可醋炙鱉甲大黃為末以牛乳一合和一匙
可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢少時惡
血即下若婦人小腸中血下盡即休服

療癰令人肥悅

出本草

右用理石漬酒服之

治老癰能為寒熱者

出本草

右用蛤蜊煮食之

治積塊

用山中生小蒜以醋服之甚効

癥瘕 附論

夫癥瘕者皆由寒濕不調飲食不化與臟氣虛冷所生也其病不動者直名為癥若病雖有結瘕而可推移者名為瘕瘕者假也謂虛假也脉動可候其人發語聲嘶澀舌語而不出此人食結在腹其病寒口中常有水出

四體灑灑常如發瘧飲食不能常自鬱鬱而痛此食癥
病也診其脉沉而中散者寒食癥也脉絃緊而細癥也
若在心下則寸口脉絃緊在胃管則關上絃緊在臍下
則尺中絃緊診脉癥法左手脉橫癥在左右手脉橫癥
在右又脉頭大在上頭小在下脉來遲而牢者為病癥
也腎脉小急肝脉小急心脉若數皆為癥寸口脉結而
伏者腹中有癥不可轉動必死不治

方

硃砂丸 治血氣癥瘕氣塊黃瘦者肚痛不忍

硃砂

錢三

全蝎

錢二

丁香

錢二

蓬朮

兩半

三稜

兩半

沒藥

兩半

光

青紅娘子

錢二

蛇虫

錢二

水蛭

錢二

阿魏

兩半

乾漆

四錢

地膽

半兩

斑蝥

錢二

海馬

一對

甘草

兩半

人參

兩半

當

歸

一兩

狗脊

兩半

穿山甲

錢三

蛤粉

麝香

少許

右為細末醋糊為丸梧子大每服二三十丸空心醋

湯送下

如意丸 治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾

沉香 木香 大丁香 草澄茄 使君子 辣

桂 川白薑 桃仁 五靈脂 硃砂 雄黃

好沒藥 大戟 牽牛 巴豆 荆三稜

炒取末 去油各半

末 蓬莪木 肉豆蔻

各半兩

右為末水煮麪糊丸如麻子大每服二丸加至三丸

止溫酒下

化癥丸 治丈夫婦人小兒年深日近沉積癥塊面色

青黃時上搶心吐水吞醋舌生白沫婦人積年月經

不調漸成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯碗連年累月漸至瘦瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不痊愈之疾並皆治之

巴豆

五兩

丁香

二兩

木香

半兩

蓬莪朮

三兩

荊三稜

三兩

丁

香

兩半

厚朴

三兩

石菖蒲

二兩

良姜

一兩半

蜚蠊

一兩半

川牛

膝

一兩

石蓮子

二兩

薏苡仁

一兩

使君子

三兩

香附子

四兩炒

右為末稀麪糊為丸如菉豆大積年癥瘕成塊第一服用熱水下二十九自後每日三丸更量虛實加減

五日去盡積塊日近脾胃有積者每服五丸飯飲吞
下婦人血氣成塊及血瘕每服二十丸蘓木用酒重
子小便各一半煎五七沸溫酒空心吞下自後每日
用溫酒下三丸其血塊逐旋消從大小二便去盡自
知小兒蛔蟲腹痛不能忍日夜叫喚橘皮湯下七丸
諸蟲皆宣下常服白湯或薑湯下三五丸中酒及酒
積大便鮮臭者白湯舊酒各半吞下七丸一切噎塞
心下硬痛如棗湯下五丸不拘時候

大黃丸 治久積癥瘕發動心腹疼痛不可忍

大黃

二雄黃兩半

麝香兩錢

天雄一兩

硃砂一分

胡椒兩半

兩

巴豆

十四枚

檳榔

四兩

當歸

一兩

桂心

一兩

木香

兩半

京三稜

兩

犀角屑

兩

乾薑

半兩

炮

右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸

如小豆大每服空心以酒粥飲下七丸

防葵丸

治癥瘕喘嗽腹中疼痛喫食減少四肢乏力

防葵

三桂心兩半

木香

兩半

桔梗

三分

吳茱萸

兩半

魚甲

一兩

普濟方

三八

半
川大黃一兩 京三稜三分 當歸半兩 赤芍藥三分 五味

子半兩 檳榔半兩 郁李仁一兩 湯浸

右搗藥為末，鍊蜜和搗，三百杵丸，如梧桐子大，每服不計時候，以酒下二十丸。

三聖丸 治積年癰癖癰塊，諸藥療理不瘥，至效。

舶上硫黃一兩 水銀半兩 硃砂一分

右三物乳鉢內研如粉，却以生鍊鉞內用文武火熬鎔成汁，以火筋攪令勻，停冷刀割下，以紙裹置地坑。

內埋一宿取出再研細次以

赤芍藥 當歸 京三稜 蓬莪茂 紅花

各一分

並細剉以法酒一升煎及一半澆出砂盆內研生布
袋取汁再熬令冷入飛羅麪為糊搗丸如菉豆大治
因產後傷於飲食結伏在腹脇特發疼痛不可忍者
當歸酒浸一升逐旋一升煖每服磨癖塊空心溫酒
下三九至五九所有藥渣漚了焙乾為末別入

乾地黄

半兩

真蒲黃

芫花

各一兩

右為末以前一般糊丸如菴豆大治婦人血臟冷氣
攻心疼一切血疾溫酒十丸

木香丸 治癥瘕心腹脹痛胃膈煩悶不欲飲食四肢
少力

木香

三分

肉桂

三分

砒霜

一分

大戟

到

京三稜

半兩

附子

半兩

附子

半兩

乾薑

半兩

乾漆

半兩

膩粉

半兩

青橘皮

半兩

巴豆

半兩

巴豆

半兩

皮心

右件藥為末入膩粉巴豆更研令勻用軟糯米飲和

丸如小豆大每服空心以粥飲下三丸

硃砂丸

出聖惠方

治癥瘕腹內疼痛

硃砂

一兩

鱉甲

一兩

木香

三分

肉桂

三分

三分

巴豆

半兩

檳榔

三分

京三稜

二兩

乾薑

三分

皂莢

取汁為膏

右件藥為末入研了藥令勻以皂莢膏和丸如菉豆大每服空心以生薑湯下三丸

京三稜散

治癥瘕氣腹脹痛

京三稜兩柴胡三桔梗一木通一當歸三赤茯苓

苓

三赤芍藥半陳橘皮半鱉甲半郁李仁三湯浸

右件藥為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

五分去滓溫服日三四服

鱉甲丸 治癥瘕或寒或熱羸瘦不欲飲食

鱉甲一桑耳二吳茱萸三龜甲一附子半防葵

三白朮半川大黃一京三稜一

右件藥為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每

服以溫酒下二十九日三服

大通丸 治癥瘕神効

川烏頭

二兩 泡

硫黃

一分 光花

巴豆

一兩 去皮心

杏仁

一兩

半

麝香

一分 黃丹

一分 炒

猪牙皂莢

一兩 去黑皮

自然銅

一兩

細研

右件藥為末入研了藥令勻用黑豆麪和丸如菉豆
大以研了自然銅末滾過服空心煎生薑橘皮湯下
三丸

元胡丸 解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心腹刺痛
癥瘕結氣蟲煩不安調順三焦安和脾胃

元胡 當歸 青皮去雄 黃連 蓬莖茂 檳榔

木香各四兩 荊三稜六分

右為細末入雄黃勻水麪糊丸如梧桐子大每服三
十九生薑湯下不拘時候

三稜湯 治癥瘕瘕癖積聚不散堅滿痞隔食不下腹
脹

荆三稜

二兩

白朮

一兩

蓬莪茂

半兩

當歸

半兩

檳榔

木香

三分

右為末每服三錢沸湯點服食後一日三服薑湯調服亦可

頂珠丸 治積氣塊痛久年脾積癖瘕之疾

丁香 木香 淡豉 硃砂 朱砂

各一分

巴豆

錢一

半

右為末陳米飯為丸如梧桐子大輕者一丸重者二

丸臨卧先嚼煨薑如指許嚥下次以冷熱水吞藥不
得嚼破上項一兩丸子請酌量用

芎藭散 治瘕瘕久不瘥令人不能食羸瘦少力

芎藭

一兩

桂心

一兩

鱉甲

二兩

川大黃

二兩

檳榔

一兩

京三稜

一兩
微炒

右件藥為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎
至六分去滓溫服日三

治瘕瘕不消宜服此方

出聖
惠方

川大黃

三兩
剉

鱉甲

二兩

檳榔

二兩

桃仁

一兩
湯浸
枳殼
二兩
麩炒

右件藥為末用醞醋三升和攪令勻以慢火熬候可
丸如梧桐子大每服空心以溫酒下二十九丸以通轉
為度

消石大丸

治二十癥瘕及婦人帶下絕產無子并欲

服寒濕散而腹中有癥瘕實者當先服之大丸下之
後與寒食散大丸不下水穀但下病其不令人困

硝石

六兩

人參

各二兩

甘草

半兩

大黃

半兩

右為末以三年苦酒三升置銅器中以竹筯柱器中
一升作一刻凡三升作三刻以置火上先內大黃常
攪不息手使微沸盡一刻乃內餘藥又盡刻餘一刻
極微火使可丸如鷄子大中黃凡合藥當先齋戒一
宿勿令小兒女奴婢人等見之欲下病者用二丸若
不能服大丸者可分作小丸然亦不可過四丸也丸
欲令大不欲令細能不分為善若人羸者可少與強
者可二十日五服和調半日乃下若婦人服之下者

或如鷄肝或如米汁正赤黑或一升或三升下後慎
風冷作一杯粥飲之後作弄臍自養如產婦法六月
則有子禁生猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與
此同日一服

治癥瘕久不瘥令人不食羸瘦少力

鰲甲

三兩

京三稜

三兩

桃仁

二百枚

右件藥鰲甲三稜為末先將桃仁水入鍋中煎三五
沸次下藥末同煎至一升漸漸入酒二升熬如飴收

瓷合中於食前以溫酒調下一匙

治癥瘕方

右用槲樹白皮煎令可丸服之取知病若不動減之
療癥瘕久痼冷病

右以雄雀屎蜜和丸飲服或和少乾薑服之大肥悅
人

療癥瘕瘕瘕并治五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節
中寒熱

右以鰲甲水煮作浴漬之甚良

積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦有氣無力
癥瘕積聚口吐酸水

檳榔

二枚

芫花

一兩

荆三稜

鷄爪黃連

牛膝

章

柳根

各一兩

青皮

陳皮

石菖蒲

各三錢

巴豆

木

香

各二錢半

大戟

川大黃

甘遂

白牽牛

乾薑

炮青礞石

乾漆

各半兩

蓬莪朮

一兩

礞砂

二兩

肉豆蔻

蔻

二枚

右為末醋麴糊丸如梧子大每服一九臨卧燒棗湯下每夜一九有積者肚內作聲病退為度

元胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

元胡 青皮 陳皮 當歸 木香 雄黃 荊

三稜 生薑

各一兩

右為末酒麴糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯下

一握七丸 治臟腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結

為癥瘕杯塊及婦人血瘕腸胃中寒飲食不下欬逆
脹滿及下痢赤白霍亂轉筋及矮臂拳攣腳膝疼痛
行步不能常服建脾暖胃堅骨強陽

神麴

半斤

大附子

二枚
炮

甘草

二兩
炙

右為末鍊蜜丸每左手一握分作七丸細嚼米飲下

如神木香丸

治槃氣聚結癥瘕胃脇悶痛或吐酸水

食後噫作生熟氣腹脹泄瀉及四肢浮腫

木香

硃砂

蓬朮

胡椒

半夏

乾漆

各半兩

縮砂仁 桂心 青皮各三兩 附子炮 三稜各一兩 白

薑炮一兩

右為末蜜丸如梧子大每服三五十九生薑橘皮湯

下空心服

乾柿丸 治多年積聚氣塊癥瘕取撒食

硃砂研 砒霜 粉霜 乾漆 鱉甲 黃連各一分

旋覆花 京三稜各半兩 杏仁去皮 乾薑各一兩 皂莢四挺

巴豆四十丸

右為細末先將乾漆熬甲京三稜三味用粟米一盞
不淘洗釀醋五升同熬成粥入眾藥拌和丸如梔豆
大每服三丸爛嚼乾柿裏藥臨卧溫下

黑神丸 消化癥瘕積聚酒食毒及冷氣膨脹五隔噎
氣婦人血氣

木香一兩官桂二兩附子一兩當歸二兩乾薑二兩細墨一兩白

朮二兩荊三稜二兩陳橘皮四兩芫花四兩巴豆二兩檳榔半兩

硃砂半兩大黃半兩

右十四味杵為末用醋麪糊為丸如麻子大如常服
化酒食茶湯下三五丸醋心腹脹橘皮湯下治癥瘕
生薑湯下婦人血氣紅花酒下多年饜食乾柿裹十
丸生薑湯下臨卧服

順氣丸 治積聚癥瘕積年氣塊發則大腸閉得通利
則病甦閉則復作

大黃

五兩半

車前子

檳榔

麻仁

牛膝

郁李

仁 兔絲

山藥

各二兩

山茱萸

防風

枳殼

獨活

各一兩

右為末蜜丸如梧桐子大茶酒米湯任下此藥補益

通利疏風順氣

治癥瘕癖氣痞積聚冷氣血塊宿食吐痰水

用青黑大巴豆勿令白膜破但去其殼作兩片清麻
油略潤之空心溫水吞下一枚以飲壓少時腹內如
火利出惡物雖利不虛人若久服亦不利膜破者不
用全而一兩頭尖如棗核者名剛字能殺人

治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老

右雄黃二兩細研為末九度水飛過却入新淨竹筒
內盛以蒸餅子一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩
為丸如菉豆大日三服酒下七丸十九

療癥瘕

出本草

右羊脂同蒜薤食一升良

治腹內癥瘕

出本草

右取鮐魚甲炙浸酒服之

治癰瘕積聚去三尸輕身益氣延年却老百病不侵甚

益人

草 出本

右用天門冬不計多少去心皮為末每服方寸匕日三四服以酒飲之不絕

治瘕

草 出本

右用菹豆葉和醋煮服之

治鷄瘕

草 出本

以蘓木一升煮服昔南齊褚澄善醫為吳郡太守百

姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重病荅曰舊有冷病至今五年衆醫不瘥澄為診曰汝病非冷非熱當時食白淪鷄子過多所致令取紫蘓一升煮服乃吐一物如斤涎裏之能動開看是鷄雛羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者鷄十三頭而病都差當時稱妙一說乃是用蒜煮服之

治癥瘕氣塊

琥珀

一兩

鱉甲

一兩

京三棱

一兩

延胡索

半兩

沒藥

半兩

大黃

六銖

右六味一處為末空心酒調服三錢每日二服神効
莫及

治癥瘕腰痛

用淡菜先煮熟漉出除去半邊鏤殼及毛將汁澄清
再將淡菜半邊殼肉入內却入蘿蔔或紫蘇冬瓜同
煮食之妙

治癰瘕

用魚脂二升盛銅器中作大火炷脂上撚之令煖徹於癰上熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良

治蛟龍病誤食蛟龍子入腹中堅痞如石

用寒食飴三升每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾寒食飴即寒食節日飴是也

昔開皇六年有人正月食芹得之其病發似癰面色青黃服寒食飴二升日吐出蛟龍有兩頭大驗

諸癥

積氣在腹中久不瘥牢固推之不移者癥也皆由寒溫失宜飲食不節致臟腑氣虛弱飲食不息按之其壯如孟盤牢結久不已令人身瘦而腹大至死不消診其脉弦而伏其堅不轉動者死之候也

方

蜥蜴丸 治癥堅水腫蜚尸遁尸百注骨血相惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留隱結積虎狼所噬獠

犬所咋鵠毒入人五臟服藥已消殺其毒食不消婦人邪鬼忤亦能遣之

蜥蜴

蜈蚣

各二枚

地膽

五十枚

蜚蠊

蚤蟲

杏仁

各三枚 蠅

十四枚

朴硝

巴豆

各一枚

款冬花

犀角

切 桃奴

澤瀉

桑赤鷄

鬼督郵

各十銖

芍藥

虎

骨

各兩半

甘草

乾薑

各一兩

甘遂

一兩

右為末別治巴豆杏仁如膏內藥末研調下蜜搗二萬杵丸如麻子先食飲服三丸旦不知加知不敢吐

下者一丸有人風冷注癖堅二十年者差

乾漆丸

出聖濟總錄

破癥塊消積氣

乾漆四兩懷香子炒令香

木香

檳榔

桂皮

去粗皮

附子

泡青橘皮

白牽牛

陳橘皮

大黃

蓬莖茂

京三稜

芫花

各二兩

五靈脂

取灰二兩

皂角

長五寸

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服生薑湯下二十

丸至三十丸忌猪魚熱麪等物

半夏礞石丸

出聖濟總錄

治癥塊氣積下結胸一切積滯

半夏四十枚巴豆四十粒

杏仁去皮猪牙皂莢去皮

礞石十挺

石研

丁香

木香

沉香各二錢

檳榔半兩

膩粉

礞石

砂

粉霜

各一分

右將後八味搗研為末入在前膏子內一處再搗約
令均丸小豆大者虛實煎棗湯下二丸爛嚼乾柿乾
嚼下亦得

礞砂丸

治癥病不消四肢羸困不欲飲食久不差

礞砂

一兩

硫黃

一兩

木香

半兩

檳榔

一兩

川大黃

三兩

牽牛子

一兩 吳茱萸 半兩 京三稜 一兩 當歸 一兩 肉桂 一兩 青橘

皮 一兩 鼈甲 一兩

右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十丸

巴豆丸 出聖惠方 治癥病久不消令人萎黃羸瘦不欲飲

食

巴豆 一兩 硫黃 細研 附子 泡 五靈脂 乾薑 丁香

木香 肉豆蔻 檳榔 硃砂 乾漆 已上各半兩

右件藥為末入諸藥研令勻以麪糊和丸如黃米大
每服空心以酒湯下五丸得下惡物為効

大黃丸 治癥病心腹妨悶不欲飲食四肢不知

川大黃

半兩

木香

半兩

肉豆蔻

半兩

硃砂

半兩

乾薑

半兩

青

橘皮

三分

吳茱萸

一分

檳榔

半兩

桂心

半兩

蓬莪茂

一分

巴

豆

一分

去皮

右為末入巴豆硃砂研令勻以醋熬成膏和丸如梧
桐子大每服空心以粥飲下三丸

鱉甲丸 治癥塊衝心氣滿食不下手足煩悶

鱉甲

去裙襴

訶梨勒

各二兩

防葵

甘草

炙

人參

大

黃

各一兩半

白朮

郁李仁

去皮桂皮

去粗

杏仁

去皮尖各一兩

右除研外搗羅為末入郁李仁杏仁同研勻鍊蜜丸

如梧桐子大空腹溫酒下二十九丸漸加至三十丸以

微利為度

沒藥丸 治癥積五積食氣諸藥無効者

沒藥 硫黃 白丁香 當歸 羌花

浸半日 硃砂

乳香

丹砂

各一兩

巴豆

四十粒

右為末合研勻用水浸炊餅和剉搗一千杵丸梧桐子大豆麻子三等大每一丸婦人血氣童子小便和酒下心頭高鞭當歸酒下遠癥積氣生薑湯下小兒脾積癥氣臘茶清下大人與大丸十五以下與中等十歲以下與第三等者

取積一塊氣丸

治男子婦人氣積

牽牛末

二兩

檳榔末

一兩

杏仁末

一兩

羌活末

一兩

神麴

半兩

麥蘗兩半雷丸兩半江子兩一黃岑兩一

右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大硃砂為衣每服
三歲服三丸五歲服五丸大人服十丸快利為度臨
睡溫水服

烏頭丸出聖惠方

治食不消結成癥病

川烏頭兩半京三稜兩半芫花兩半巴豆兩半去皮硃砂湯化硝

石兩半川大黃兩半青橘皮湯浸

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以酒一升相和以

慢火煎如稀餚火住後用丁香一分肉豆蔻半兩搗羅為末硃砂一分細研與前藥同和丸如菉豆大每日早晨以生薑橘皮湯下三丸夜臨卧時服

京三稜丸

出聖惠方

治癥病結鞭心腹疼痛

京三稜

一兩半

檳榔

一兩

木香

一兩

乾薑

一兩

陳橘皮

一兩

桂心

半兩

當歸

一兩

巴豆

半兩

右件藥為末用醋熬巴豆成膏入前藥末和丸如梧桐子大每服空心以生薑橘皮湯下五丸

當歸煮散 治諸癥結痛起於脇下按之而堅妨痛不能飲食漸加羸瘦

當歸 鱉甲 桂皮 木香 桔梗 桃仁

研如膏各

一兩半 吳茱萸

兩半

右除桃仁外搗羅為末入桃仁同研令勻每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服逐日空腹日一服夜半一服

保命丸 治積年血氣癥塊往來疼痛吐逆不納飲食

當歸 烏頭 芍藥 桂 各半 大黃 一兩 乾薑 半兩 班

蝥 二十枚

右為末醋煮麴糊丸梧桐子大空心服食前溫酒下

一丸

木香禰丸 治癥塊消食積止心腹疼

木香 硃砂 各一錢 半夏 十枚 桂 去粗皮 華撥 四十粒 巴豆

二十粒 杏仁 二十粒

右為末先將杏仁巴豆同研入泥以好米醋八分一

盞熬至二分以下成稠膏入前藥末和勻再入棗肉
丸棗豆大捏褊丸常服食後良久一九生薑湯下要
轉三丸男子婦人心痛炒棗服醋湯下

破積丸 療積聚堅癥

大黃一斤牡蠣三兩凝水石 石膏 石鐘乳 理石

各一
兩

右搗合下篩如蜜丸如梧桐子大先食酒服飲任下
三九日三不知稍增之以知為度

治腹中積癥方

出千金方

右葶藶子一升炒以酒五升浸七日每服三合日三服

粉砂餅

出聖濟總錄

治癥塊

輕粉

胡粉

各一兩

硃砂

丹砂

白丁香

膩粉

各半兩

右研為末入麪一兩水捏作餅如棊子大慢火燒熟每服一餅麝香米飲嚼破服

五靈脂丸

出聖惠方

治癥病腹中結便

五靈脂

一兩

防葵

半兩

桂心

半兩

猪牙皂莢

半兩

木香

半兩

右件藥為末入巴豆更研令勻用醋煮麴糊和丸如

黍米大每服空心臨卧時以生薑酒下三丸

木香丸

治積年癥塊血氣凝滯

吳茱萸

木香

青橘皮

各半兩

巴豆

去皮十粒

硃砂

研一

分

右除硃砂外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻於塘火

中煨粟米飯丸菴豆大每服溫酒下三丸至五丸食
後服瀉痢勿怪老小減服

硃砂丸 治癰病腹中硬痛不欲食經久不差羸弱無
力

硃砂一兩 肉桂一兩 巴豆二枚 禹餘糧一兩 紫石英一兩
細研

右件藥都研令勻以湯浸蒸餅和丸如菴豆大每服
食前以溫酒下五丸

治積年癰塊及血塊方

出聖惠方

砒霜

粉霜

各一分

硃砂

半

膩粉

三分

右件藥細研令勻用肥棗去核入藥在棗裏面以綿繫定用白麪餅子逐箇裏燒熟餅子為度取出去棗皮研熟丸如菉豆大每服空心及臨卧時以薑棗湯下三丸

治癥病腹中結硬

出聖惠方

硫黃

一兩 硃砂

一兩 巴豆

一兩 附子

一兩 泡裂

右件藥先用頭醋二升煮巴豆令赤色即出之却入

冷水碗中浸兩炊久洗淨去皮心研如粉又以醋二升與巴豆同煎至一升後下硫黃硃砂附子等末以文火熬令稀稠得所別入乾薑末一兩和黍米大每服空心以生薑棗湯下三丸夜臨卧時再服

續隨子丸 治積聚癥塊及涎積等

續隨子三十枚 膩粉二錢 青黛炒一錢

右先研隨子令爛次下二味合研勻細以燒糯米軟飯和丸如鷄頭子大每服先燒大棗一枚剥去皮核

爛嚼取藥一九錐破并棗用同冷鴈茶清下服後便
卧並不攪至中夜後取下積聚惡物為効

治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹絞痛
方

葶藶子 大黃

各二兩 澤瀉四兩

右別研葶藶為膏其二味搗五百杵入蜜更搗千杵
和丸如梧桐子大每服五丸不知加之日三服

治脇下有氣結者

狼毒

二兩

旋覆花

一兩

附子

二兩

泡

右搗篩蜜和丸如梧桐子大二丸稍加至三丸服之

療癰病丸

射蔞

二兩

蜀椒

三百枚

右搗末細篩以鷄子白和丸半如麻子大半如赤小

豆先服如麻子漸服如小豆二丸不知稍增之以知

為度

熨癰方

竈中黃土一斤生葫一斤

右先搗葫熟納土復搗以好苦酒澆冷浥浥先以塗布一面仍揜病上又塗布上乾復易之取冷消止一方有桂

熨癰方

右以吳茱萸三升碎之酒和煮熱布裹以熨癰上冷更炒更番用癰之移走逐熨都消乃止也肘後方云亦可用茵五兩茱萸末以鷄子白和塗上癰

熨癰法

右銅器受二升許貯魚膏令深三二寸作大火炷六七枚燃之令膏煖重紙覆癰上以器熨之盡夜勿息膏盡更益也

凡癰堅之起多以漸生而有覺便年大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷水王壺八毒諸大藥令止取小小易得者方

右取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之

擣作末以秫米五升炊飯內攪之好酒五斤漬封藥
消飯浮可飲一斤半勿食他鮓鹽癥當出亦可取其
根一片乾搗千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒
療癥乃勝諸大藥

又方

大黃

半斤

朴硝

三兩

蜜

一斤

右合於湯上煎可丸如梧桐子大服十丸日三脩急
文仲崔氏同惟崔氏用朴硝半斤蜜一斤半服二十

丸日再服

破癥散 治心腹宿癥及卒得癥并治久積癥癖不差
漸至羸弱宜服此方

右以硃砂細研搜飯令硃多以雄鷄一隻先餓二日
後以硃飯飼之却置雞於板上收取糞曝燥為末溫
清酒服五分七可至方寸七日三服若病困急者盡
夜可五六服一鷄少更飼餘鷄取足鷄末食硃飯先
飼令肥

治癥積滿腹諸藥不差者人尿服之皆下血片塊二十日即出也

椒熨方 治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍傍左右或在臍上下或若別在左右肋下或當心合子大法先針其足以椒熨之

右取新盆子受一斗者鑽一百二十孔上著一重紙上著冷灰上著熟灰半升上著則灰火一升經一食頃盆底熱徹當病上初安氈一重即安火盆火盤大

熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇
進一冷日飲還上火硝二分許即停止經止日勿着
令至七日決得稍瘥然後食美食自補若小不瘥作
露宿丸服之

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛
久不止及遶臍腹痛不可忍者

川大黃

三兩乾薑一兩

炮大附子

半兩鱉甲一兩

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後合藥

九如梧桐子大每服十丸空心或醋或酒米飲下後
取疾如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

京三稜湯 治積年癥塊

京三稜

一兩

青橘皮

半兩

桂

去粗皮

一兩

大黃

半兩

木香

一分

檳

榔

剉半兩

右粗搗篩每服五錢七分水一盞半煎至七分去滓
溫服空腹日午夜卧各一服

治諸瘕結氣

出本草

右取赤龍浴水服之

枳朮湯

出衛生寶鑑

治心下堅如大盤飲水所作

枳實

白朮

各三兩

右以水一斗煎至三升分三服腹中軟即消滅之對

病增損

治癥結

出本草

右用磨石洗赤熱投酒中飲之

暴癥

附論

病源云暴癥者中藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而無漸之暴癥也本中藏弱其癥暴生至於成病斃人最速

方

蜥蜴丸

出聖惠方

治暴癥堅結四肢瘦軟身無力

蜥蜴

一枚

蜈蚣

一枚

鬼臼

漢防己

半

當歸

二兩

川

大黃

二兩

川芒硝

赤芍藥

二兩

剉

右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不

計時候溫酒下十丸為度

野葛丸

出千金方

治卒暴癱

野葛

一尺

當歸

附子

雄黃

細辛

各一兩

蜀椒

半兩

烏頭

二兩

巴豆

右㕮咀以醋浸一宿猪膏一半斤煎附子色黃去滓
內雄黃粉攪至凝傅布上以掩癰處復以油重布上
復著紙重以熨斗盛火著其上常令熱日三夜二猪
膏乾為度

巴豆丸

出聖惠方

治暴癰氣攻心腹脹痛不欲飲食

巴豆

一分去皮心

川大黃

半兩剉

乾薑

半兩炮

木香

半兩蓬莪

茂

半兩

右件藥為末入巴豆同研令勻鍊蜜和丸搗三二百杵丸如小豆大每服空心以生薑湯下五丸

治卒暴癰腹中有物如石痛如刀刺晝夜啼呼宜服此

方

出聖惠方

右牛膝三斤去苗剉以酒一斗漬密封於熱灰中燒

令味出每於食前量力頻服以差為度便吐去宿食
神効

又方

出聖
惠方

右用商陸根不限多少剉搗蒸之以新綿裏熨病上冷
即換之以衣物覆其上數日用旦夕勿息

又方

出聖
惠方

右蒴藿根二箇細剉以酒一斗浸三五日每於食前
煖一小盞服之

治卒暴癰腹中有物

出聖惠方

右以五月五日蒜十片去皮桂一尺二寸竈中黃土如鴨子一枚合搗以苦酒和塗以布揅病不過三次

又方

出肘後方

右取檮木燒為灰淋取汁八升以釀一斛米酒成服之從半合始不知稍稍增至二升不盡一劑皆愈此灰入染絳用葉中釀酒也

又方

出聖惠方

右以蠶沙一年桑柴燒灰一斗以水淋之五度取生
蠶長一尺者內中煮之爛熟去骨細擘剉更煎令可
丸丸如梧桐子大一服七丸日三食前以溫酒下

又方

出肘
後方

右以大豬心一枚破頭去血搗末雄黃麝香當門子
五枚巴豆百枚去心皮生用心縫以好酒於小銅器
中煎之看心沒欲歇隨益盡三升當糜爛煎令可丸
如麻子服三丸日三服酒盡不糜者出搗蜜丸之良

久大黃末半斤朴硝三兩蜜一斤合於湯上煎丸如
梧子服十丸日三服之

治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日

內死

方見
本門

主暴癥

用虎杖根酒漬服之

食癥

附論

夫脾胃虛弱飲食類傷積久不去結在腹內與正氣交

爭則心復鞭痛妨害飲食肢體消瘦以手按之積塊有形謂之食癥

方

木香散 治食癥冷氣及傷寒後一切氣疾食物不消

木香 檳榔 青橘皮 肉豆蔻 食茱萸 紅

豆蔻 乾薑 白朮 葛根 草豆蔻 虎杖

麻黃 厚朴 桔梗 桂去粗皮 羌活 人參 芎

藭 已上各等分

右為細末每服三錢空心炒薑鹽湯調下

京三稜丸 治食癥癖氣食勞宿食不消痰逆

京三稜

半兩

乳香

半兩

木香

半兩

丁香

半兩

肉豆蔻

半兩

當歸

半兩

半兩紫苑

一兩

五靈脂

半兩

青橘皮

半兩

乾薑

一兩

附子

一兩

炮硃砂

半分

硃砂

一兩

巴豆

一兩

猪牙莢

一兩

鱉甲

二兩

右件藥以乳香巴豆同搗如泥餘藥搗羅為末先以
醞醋一斤化硃砂去石滓熬令稠入麝煑為糊和諸
藥末令軟硬得所搗三五百杵丸如菉豆大每服以

溫酒下三九至五九

化積丸 治食癥積氣成塊胃腸痞悶腹脇脹滿宿食

不消心腹疼痛不能飲食

一名五積丸

硃砂

芫花

巴豆

各半兩

乾漆

一兩

烏頭

猪牙皂

莢

去尖各三分

大黃

一兩

蟄甲

青橘皮

京三稜

當

歸

陳麴

炒各一兩

木香

桂

去粗皮各三分

右十四味搗羅八味用前藥和丸如棗豆大每服二
九至三九茶酒任下如取積量虛實加減

三稜丸 治食癥勞氣五積五隔脾胃久冷噎食無味
飲食不化四肢少力痰毒氣脹胸膈不利

京三稜 石三稜 鷄瓜三稜 黑三稜 各煨巴

豆 乾薑 蓬莪茂 附子 泡各一兩 丁香 木香

桂 檳榔 青橘皮 肉豆蔻 各半兩

右為末每秤一兩末別用巴豆七枚去皮心膜出油
細研拌勻更用硃砂一分醋化煮麪糊和丸如麻子
大丹砂為衣每服三丸至五丸生薑湯下

黑金丸 治食癥瘕癖聚血結刺痛一切疾

沉香

附子

各半兩

木香

乾薑

青橘皮

炒細墨

炒桂

去粗皮

京三稜

蓬莪茂

各一分

大黃

乾漆

麝香

各半兩

硃砂

研一兩

右為末將京三稜蓬莪茂大黃硃砂四味用米醋煮爛研作糊入眾藥末和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸薑鹽湯下不拘時

丁香丸

治食癥氣堅腹中疼痛

方見久積類

木香丸 三稜丸 治遠年食癥積氣并酒食所傷胸膈

脹滿及婦人血塊

木香 京三稜 補骨脂 牽牛子 丁香皮

乾漆 各一兩 烏梅肉 陳橘皮 五靈脂末 各二兩 沉

香 半兩 巴豆霜 一分

右搗羅九味為末入二味膏子和丸如菉豆大每服五丸至七丸食後臨卧生薑湯下

檳榔丸 治食癥氣

檳榔 木香 郁李仁 芫胡 大黃 枳殼

桂 訶梨勒 草豆蔻 乾薑

右搗羅九味為末入郁李仁同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下日晚再服

穿山甲丸 治食癥破結塊取積年食及積惡血氣並宜服此

穿山甲 乾薑 硃砂分半夏 歲靈仙半班螯

一肉桂分一 川烏頭 羌花 巴豆

右件藥為末入巴豆硃砂令勻用糯米飯和丸如豆
大每服食前煎橘皮湯放冷下三丸

硃砂丸 治食癥結塊疼痛發渴化氣消酒食

硃砂 乾漆各一分 木香 蓬莪朮 丁香 京三

稜 青橘皮 芫花各半兩 肉豆蔻五枚 巴豆一分半

右將米醋一椀浸蓬莪朮芫花三稜一宿後焙乾與
五味同搗羅為末入硃砂巴豆拌勻醋煮麪糊和丸
如麻子大每服三二丸如要取轉看虛實加減生薑

湯下婦人血氣醋湯下小兒疳氣甘草湯下男子膈氣龍腦湯下瀉痢甘薑湯下

澤漆丸

出聖惠方

治食癥癖氣脾胃虛弱頭面四肢浮腫

欲變成水病者

澤漆

半兩

檳榔

一兩

附子

一兩

木香

半兩

肉桂

半兩

陳橘皮

半兩

浸澤瀉

半兩

川大黃

半兩

郁李仁

半兩

厚朴

半兩

粗皮

去

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以溫水下二十九日三四服

麥蘖丸

出聖濟總錄

治食癥嘔酸吐津胃膈疼痛氣噎食

飲進退

麥蘖

炒

陳麴

炒

厚朴

檳榔

紫苑

鯢甲

當

歸

大黃

各半兩

右麴搗篩每服五錢用水一盞半煎至七分去滓溫服空心午時臨卧各一服

八靈丸

治食癥氣塊痞癖等疾

京三稜

石三稜

鷄爪大連

木香

檳榔

各一

肉豆蔻兩半 巴豆兩半 硃砂研各一分

右搗羅六味為末入巴豆霜硃砂末拌勻醋煮麪糊和丸如小豆大每服五七丸男子生薑湯下婦人醋湯下瘕癖氣煎木香湯下

硃砂丸

出聖惠方

治食癥及氣塊攻刺心腹疼痛不可忍

硃砂

半兩

巴豆

半兩

乾薑

一兩

附子

一兩

青橘皮

一兩

湯浸

京

三稜

一兩

乾漆

一兩

香墨

半錠

右件藥各別搗細羅為散內取硃砂巴豆細研用頭

醋兩碗煎為膏然後摠入諸藥末相和丸如菉豆大
每服食前以溫酒下三丸

通靈丸

出聖惠方

治食癥及惡血氣

五靈脂

兩一

巴豆

兩一

硫黃

兩一

杏仁

兩一

川烏頭

兩一

芫花

半皂莢

兩一

自然銅

兩一

右件藥搗為末入巴豆研令勻別入生薑黑豆麴二
兩拌和令勻滴水為丸如菉豆大每服以生薑湯下
二丸膈上有涎即吐有滯食血氣即轉下

礞石丸

出聖惠方

治食癥久不消

礞石

半兩

硃砂

半兩

乾漆

一兩

附子

一兩

京三稜

一兩

青橘

皮

一兩

香墨

半兩

巴豆

一兩

去皮

右件為末以頭醋三升化硃砂研巴豆大銀鍋子內微火煎成膏入諸藥末和丸如菉豆大每服三丸宿食不消茶下婦人血癥當歸酒下心痛橘皮生薑湯下

治食癥心腹疼痛脹滿面色萎黃不下食宜服此方

出聖

方惠

巴豆

兩半

京三稜

兩二

乾漆

兩半

川大黃

兩半

青橘皮

兩一

附

子

兩半

砲

硃砂

分一

香墨

兩半

右件藥搗羅都細研為末以醋煮麴糊和丸如梧桐

子大每服食前以醋湯下五丸當下惡物即差

如聖散 治男子婦人飲食所傷結成積塊痞痛

陳皮

乾薑

錢各三

巴豆

錢一

甘草

半一錢

三稜

莪朮

芫花

三味各半

右為末和勻餘醋煮糊為丸如菉豆大每服六七丸

淡薑湯下

木香丸

出聖惠方

治食癥及喫食不著

木香

一兩

桂心

一兩

五靈脂

一兩

乾薑

一兩

乾墨

一兩

猪牙

皂莢

一兩

去

巴豆

半兩

去

黑皮

皮心

右研為末入巴豆研勻用軟糯米飲和丸如菉豆大

每服食前以生薑橘皮湯下五丸

治年積食癥方

出聖惠方

青礞石一兩 礞砂半兩 芫花半兩 木香一分 丁香一分 巴豆三

枚去皮 川大黃三兩

右件為末入諸藥同研令勻以頭醋二升熬藥令稠可丸即如菉豆每服食前以生薑湯下三丸

治食癥結塊在腹內不能飲食面色萎黃宜服此方出聖

惠方

礞砂半兩 芫花一兩 麥蘖半兩 青橘皮半兩 猪牙皂莢五挺

巴豆半兩 去皮

右件為末入巴豆都研令勻先將皂莢汁於鍋子內慢火煎成膏然後取藥末一半更入米醋一大盞同煎令稀稠得所其餘藥為末丸如梧子大每服以生薑橘皮湯下三丸

萬金丸

出聖惠
總錄

治食癥氣聚不消

檳榔

肉豆蔻

青橘皮

乾薑

木香

各一巴
兩

豆

去皮心
五十粒

右搗羅五味為末入巴豆同研令勻浸鹽豉和丸如

梧桐子大每服一二九煎生薑橘皮湯下良久以粥飲投之以利為度

麝香丸

出聖惠方

治積年食癥

麝香

一分 硃砂

半兩

川大黃

半兩

神麴

一分

巴豆

三十粒

寒食

白麴

一兩
生用

右件為末入研了藥令勻用易州墨汁和丸如梧子大如是十年至十五年食癥即先嚼乾柿半枚裹藥一丸同嚥之如尋常食癥即丸如豌豆大茶酒任下

一丸

治卒食不消欲成癥積方

出千金方

右用煎艾汁如飴取半升作一服便盡吐出宿食一

方用艾五尺圍一束苡薏根一大把二味同煎

治雜食瘀滯不消心腹堅痛方

出千金方

右用水三升煮白鹽一升令消分三服吐去所食并

治暴癥

巴豆丸

出聖惠方

治積年食癥

巴豆十枚 陳橘一兩 大黃三錢 硃砂一錢 神麴三錢 羌活二錢

右件藥為末入巴豆等同令研勻磨香墨濃汁和搗令勻丸如梧桐子大每臨卧時用乾柿一枚分為三分爛嚼破裹藥一丸嚥之如此服三丸後喫湯飲下之至明當利下宿食隔日再服取差為度

五通丸

出聖濟
總錄

治食癥氣

乾薑

炮二兩

巴豆

半兩 陳橘皮

黃連

白朮

各一分

白皮煎湯下或鹽湯下婦人醋湯下

進食方

出儒門

川牛一巴豆三

兩箇

右為末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下

療凡所食不消方

方見本門

療食癥病取生葱食之瘥○昔有人每食飲七升并羊脂餅不論數因道中過饑食生葱須臾吐出一虫薄而圓繞畔有口試以食投之立消盡自吐此物後其人病便愈此名食癥無疑人有思肉不已食訖復思者為肉

癥治之方

出千金方

右空腹飲白馬尿三升吐出肉不出必死

治蠱食癥方

出聖惠方

右綠礬二兩搗研如粉以米醋一大碗於瓷器內煎之用柳木篾攪成膏入赤烏脚一兩細研和丸如菰豆大每服空心溫酒下五丸

治食癥方

出聖惠方

右以青州棗三枚去核每箇入膩粉一錢以白麪裹

燒熟即去麪空心以棗爛嚼嚥水下之即瀉下癥塊

白銀透羅丹 治積塊食積大便不行疼痛難忍

寒食麪

錢七

巴豆

錢三

天南星

半夏

錢各一
半

右為末滴水為丸搗作餅子如桐子大每服七丸食後熬煮二服冷漿淘過冷水送下忌熱物等

積氣丸 治積年食氣癥塊消酒食利噎塞

木香

半兩

乾薑

炮一兩

礞砂

半兩

巴豆

半兩

川大黃

一兩

附子

一官桂

半兩

筒子漆

一兩

荆三稜

一兩

蓬莪茂

一兩

芫花

半兩

青橘

半兩

細墨

半兩

檳榔

半兩

大戟

半兩

肉豆蔻

五箇

右一十六味先將荆三稜大黃二味為末研巴豆令
細入醋一升半煎此二味至半碗許入硃砂又同研
入醋麪一匙成膏加諸藥末合和得所再入白杵三
五百下丸如菴豆大每服五丸如食癥氣用生薑橘
皮湯下本臟氣茴香湯下赤白痢二宜湯下婦人血
氣當歸酒下常服任下



普濟方卷一百七十三